



Apotheken und Medikamente
im Vergleich

[Zum Medikament](#) →

Gebrauchsinformation: Information für Patienten
Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly 20mg Beipackzettel
Zur Anwendung bei männlichen Erwachsenen
Tadalafil

In diesem Beipackzettel finden Sie verständliche Informationen zu Ihrem Arzneimittel – unter anderem zu Wirkung, Anwendung und Nebenwirkungen. Wählen Sie eines der folgenden Kapitel aus, um mehr über „Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly 20mg“ zu erfahren.

Wie wirkt der Inhaltsstoff des Arzneimittels?

Der Wirkstoff Tadalafil sorgt dafür, dass ein wichtiger Botenstoff zur Erektion des Penis im Überfluss vorhanden ist, indem er den Abbau des Stoffes hemmt. Der Botenstoff lässt die Gefäßmuskulatur des Schwellkörpers erschlaffen, Blut kann ungehindert einströmen. Dadurch, dass gleichzeitig der Blutrückstrom gehindert wird, füllt sich der Penis prall mit Blut und er wird steif.

Der Wirkstoff Tadalafil kann jedoch nur eingreifen, wenn der Mann sexuell stimuliert ist.

Außerdem erhöht der Wirkstoff die Menge dieses Botenstoffes in den Lungen und führt auch dort zu einer Entspannung und Erweiterung der Blutgefäße. Ein erhöhter Blutdruck in der Lunge kann dadurch gesenkt werden.

Anwendungsgebiete

- Erektionsstörung

Dosierung von Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly

Erektionsstörung: Einmalige Gabe:

Erwachsene

- Einzeldosis: 1 Sachet
- Gesamtdosis: 1 Sachet
- Zeitpunkt: ca. 30 Minuten vor einer sexuellen Aktivität

Patienten mit einer Leber- oder Nierenfunktionsstörung: Sie müssen in Absprache mit Ihrem Arzt eventuell die Einzel- oder die Gesamtdosis reduzieren oder den Dosierungsabstand verlängern.

Anwendungshinweise

Die Gesamtdosis sollte nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker überschritten werden.

Art der Anwendung?

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.

Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?

- Schwangerschaft: Das Arzneimittel sollte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht angewendet werden.
- Stillzeit: Von einer Anwendung wird nach derzeitigen Erkenntnissen abgeraten. Eventuell ist ein Abstillen in Erwägung zu ziehen.

Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.

Wichtige Hinweise zu Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly

Hinweise zu den Bereichen Allergien (betreffend Wirk- und Hilfsstoffe),
Komplikationen mit Nahrungs- und Genussmitteln, sowie sonstige Warnhinweise.

Was sollten Sie beachten?

- Vorsicht bei Allergie gegen Bindemittel (z.B. Carboxymethylcellulose mit der E-Nummer E 466)!

- Vorsicht bei einer Unverträglichkeit gegenüber Lactose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie den Zuckergehalt berücksichtigen.

- Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.

- Auf Grapefruit sowie Grapefruit-Zubereitungen soll während der Behandlung mit dem Medikament vollständig verzichtet werden.

Nebenwirkungen von Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly

Nebenwirkungen sind unerwünschte Wirkungen, die bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Arzneimittels auftreten können.

Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?

- Magen-Darm-Beschwerden, wie: Sodbrennen
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Augenschmerzen
- Bindehautrötung
- Lidödem (Lidschwellung)
- Sehstörungen, bei Auftreten bitte sofort einen Arzt aufsuchen
- Nasenbluten
- Schnupfen
- Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, wie: Hautrötung, Hautausschlag,
- Nesselausschlag
- Schwitzen
- Pulsbeschleunigung
- Herzklopfen
- Niedriger Blutdruck
- Bluthochdruck
- Rückenschmerzen
- Muskelschmerzen
- Brustschmerzen

Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.

Wechselwirkungen

Wenden Sie mehrere Arzneimittel gleichzeitig an, kann es zu Wechselwirkungen zwischen diesen kommen. Das kann Wirkungen und Nebenwirkungen der Arzneimittel verändern.

Verschiedene Arzneimittel können sich auf Tadalafil auswirken:

- CYP3A4-Inhibitoren wie Ketoconazol, Ritonavir => erhöhte AUC und C_{max} von Tadalafil
 - Saquinavir, Erythromycin, Clarithromycin, Itraconazol, Grapefruitsaft => erhöhte Tadalafil-Plasmaspiegel möglich
 - CYP3A4-Induktoren wie Rifampicin, Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin => verringere Tadalafilplasmakonzentration
 - Mögliche Wechselwirkungen mit Arzneimitteln, die Transportproteine beeinflussen

Ebenso wirkt sich Tadalafil auf andere Arzneimittel aus:

- Nitrate => verstärkte Blutdrucksenkung
- Antihypertensiva, einschließlich Calciumkanal-Blocker wie Doxazosin => deutlich erhöhte blutdrucksenkende Wirkung und Synkopen bei einzelnen Präparaten möglich. Die Mehrzahl der Wirkstoffe hat jedoch in Studien keine deutlichen Wechselwirkungen gezeigt.
 - Riociguat => verstärkte Blutdrucksenkung
 - Ethinylestradiol, Terbutalin => erhöhte orale Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe.

Wechselwirkungen zwischen Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly und Lebens-/Genussmitteln

Bitte verzichten Sie auf Grapefruit, grapefruitartige Früchte (z.B. Pomelo) und grapefruithaltige Lebensmittel, solange Sie das Arzneimittel einnehmen.

Was ist in Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly?

Der Wirkstoff von Apcalis*-sx 20 mg Oral Jelly ist Tadalafil. Jedes Sachet enthält 5g Gelee und 20 mg Tadalafil.

7 Sachets in der Packung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Ajanta Pharma Limited

Ajanta House, Charkop, Kandivli West, Mumbai 400 067, India

Tel : +91 22 6606 1000 | Fax : +91 22 6606 1200

Ajanta Pharma USA Inc

One Grande Commons, 440 US Highway 22 East, Suite 150, Bridgewater, NJ 08807

Tel : +1 908 252 1165 | Fax : +1 908 393 5505

Ajanta Pharma Philippines Inc.

710 AXA Life Center, Sen. Gil Puyat Ave Corner Tindalo St, San Antonio Village,

Makati City 1200, Metro Manila, Philippines

Ajanta Pharma (Mauritius) Limited

BPML Building, Goodlands, Mauritius

Tel : +230 2830334 / 358 | Fax : +230 2831172