



Apotheken und Medikamente  
im Vergleich

[Zum Medikament](#) →

## **Beipackzettel von TADACIP 20 Tabletten**

In diesem Beipackzettel finden Sie verständliche Informationen zu Ihrem Arzneimittel – unter anderem zu Wirkung, Anwendung und Nebenwirkungen. Wählen Sie eines der folgenden Kapitel aus, um mehr über "Tadacip 20 mg Tabletten" zu erfahren.

### **Wie wirkt der Inhaltsstoff des Arzneimittels?**

Der Wirkstoff sorgt dafür, dass ein wichtiger Botenstoff zur Erektion des Penis im Überfluss vorhanden ist, indem er den Abbau des Stoffes hemmt. Der Botenstoff lässt die Gefäßmuskulatur des Schwellkörpers erschlaffen, Blut kann ungehindert einströmen. Dadurch, dass gleichzeitig der Blutrückstrom gehindert wird, füllt sich der Penis prall mit Blut und er wird steif.

Der Wirkstoff kann jedoch nur eingreifen, wenn der Mann sexuell stimuliert ist. Außerdem erhöht der Wirkstoff die Menge dieses Botenstoffes in den Lungen und führt auch dort zu einer Entspannung und Erweiterung der Blutgefäße. Ein erhöhter Blutdruck in der Lunge kann dadurch gesenkt werden.

### **Anwendungsgebiete**

- Erektionsstörung

### **Dosierung von Tadacip 20 mg Tabletten**

Einmalige Gabe:

- Erwachsene
- Einzeldosis: ½ Tablette
- Gesamtdosis: ½ Tablette
- Zeitpunkt: ca. 30 Minuten vor einer sexuellen Aktivität

Bei unzureichender Wirkung kann die Dosis nach Rücksprache mit dem Arzt auf 1 Tablette erhöht werden.

Patienten mit einer Leber- oder Nierenfunktionsstörung: Sie müssen in Absprache mit Ihrem Arzt eventuell die Einzel- oder die Gesamtdosis reduzieren oder den Dosierungsabstand verlängern.

### **Anwendungshinweise**

Die Gesamtdosis sollte nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker überschritten werden.

### **Art der Anwendung?**

Nehmen Sie das Arzneimittel mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) ein.

### **Dauer der Anwendung?**

Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art der Beschwerde und/oder Dauer der Erkrankung und wird deshalb nur von Ihrem Arzt bestimmt.

### **Überdosierung?**

Bei einer Überdosierung kann es unter anderem zu Kopfschmerzen, Verstopfung der Nase sowie zu Sehstörungen kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.

Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.

Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.

### **Gegenanzeigen von Tadacip 20 mg Tabletten**

Beschreibt, welche Erkrankungen oder Umstände gegen eine Anwendung des Arzneimittels sprechen, in welchen Altersgruppen das Arzneimittel nicht eingesetzt werden sollte/darf und ob Schwangerschaft und Stillzeit gegen die Anwendung des Arzneimittels sprechen.

### **Was spricht gegen eine Anwendung?**

Immer:

- Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe
- Herzinfarkt, der erst kurze Zeit zurückliegt (bis 3 Monate)
- Schlaganfall, der erst kurze Zeit zurückliegt (etwa 6 Monate)
- Sehverlust durch einen Gefäßverschluss am Auge
- Unter Umständen - sprechen Sie hierzu mit Ihrem Arzt oder Apotheker:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie:
- Angina pectoris
- Herzschwäche
- Herzrhythmusstörungen
- Niedriger Blutdruck
- Bluthochdruck

- Erkrankungen (z.B. Leukämie, Sichelzellenanämie, Plasmozytom) bei denen ein Priapismus auftreten kann (Stunden bis Wochen anhaltende, meist schmerzhaftes Dauererrektion des Penis ohne sexuelle Empfindung)
- Penismissbildungen, wie z. B. Verkrümmungen
- Eingeschränkte Leberfunktion
- Das Arzneimittel ist für Frauen nicht geeignet.

### **Welche Altersgruppe ist zu beachten?**

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.

### **Was ist mit Schwangerschaft und Stillzeit?**

Schwangerschaft: Das Arzneimittel ist für Frauen in der Regel nicht geeignet. Sollte sich die Frage nach einer Anwendung aus irgendwelchen Gründen trotzdem stellen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Stillzeit: Fragen Sie in Ausnahmefällen auch dazu Ihren Arzt, da das Arzneimittel für Frauen in der Regel nicht geeignet ist.

Ist Ihnen das Arzneimittel trotz einer Gegenanzeige verordnet worden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Der therapeutische Nutzen kann höher sein, als das Risiko, das die Anwendung bei einer Gegenanzeige in sich birgt.

### **Wichtige Hinweise zu Tadacip 20 mg Tabletten**

Hinweise zu den Bereichen Allergien (betreffend Wirk- und Hilfsstoffe), Komplikationen mit Nahrungs- und Genussmitteln, sowie sonstige Warnhinweise.

### **Was sollten Sie beachten?**

Vorsicht bei einer Unverträglichkeit gegenüber Lactose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie den Zuckergehalt berücksichtigen.

Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.

Auf Grapefruit sowie Grapefruit-Zubereitungen soll während der Behandlung mit dem Medikament vollständig verzichtet werden.

### **Nebenwirkungen von Tadacip 20 mg Tabletten**

Nebenwirkungen sind unerwünschte Wirkungen, die bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Arzneimittels auftreten können.

## **Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten?**

Magen-Darm-Beschwerden, wie:

Sodbrennen

Kopfschmerzen

Schwindel

Augenschmerzen

Bindehautrötung

Lidödem (Lidschwellung)

Sehstörungen, bei Auftreten bitte sofort einen Arzt aufsuchen

Nasenbluten

Schnupfen

Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, wie:

Hautrötung

Hautausschlag

Nesselausschlag

Schwitzen

Pulsbeschleunigung

Herzklopfen

Niedriger Blutdruck

Bluthochdruck

Rückenschmerzen

Muskelschmerzen

Brustschmerzen

Bemerken Sie eine Befindlichkeitsstörung oder Veränderung während der Behandlung, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Für die Information an dieser Stelle werden vor allem Nebenwirkungen berücksichtigt, die bei mindestens einem von 1.000 behandelten Patienten auftreten.

## **Wechselwirkungen**

Verschiedene Arzneimittel können sich auf Tadacip auswirken:

- CYP3A4-Inhibitoren wie Ketoconazol, Ritonavir: erhöhte AUC und  $C_{max}$  von Tadalafil
- Saquinavir, Erythromycin, Clarithromycin, Itraconazol, Grapefruitsaft: erhöhte Tadalafil-Plasmaspiegel möglich
- CYP3A4-Induktoren wie Rifampicin, Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin: verringere Tadalafilplasmakonzentration
- Mögliche Wechselwirkungen mit Arzneimitteln, die Transportproteine beeinflussen

Ebenso wirkt sich Tadacip auf andere Arzneimittel aus:

- Nitrate: verstärkte Blutdrucksenkung

- Antihypertensiva, einschließlich Calciumkanal-Blocker wie Doxazosin: deutlich erhöhte blutdrucksenkende Wirkung und Synkopen bei einzelnen Präparaten möglich. Die Mehrzahl der Wirkstoffe hat jedoch in Studien keine deutlichen Wechselwirkungen gezeigt.
- Riociguat: verstärkte Blutdrucksenkung
- Ethinylestradiol, Terbutalin: erhöhte orale Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe.

## **Verkehrstüchtigkeit**

Der Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit ist vernachlässigbar. Patienten sollten jedoch darauf hingewiesen werden, dass aufgrund von Nebenwirkungen, eine Beeinträchtigung entstehen kann und sie nach den ersten Gaben nicht Auto fahren oder Maschinen bedienen sollten.

## **Hinweise**

### **Kardiovaskulärer Status**

Vor Beginn einer Behandlung der erektilen Dysfunktion sollte der Arzt den kardiovaskulären Status seines Patienten prüfen, da sexuelle Aktivität mit einem gewissen Risiko für das Herz verbunden ist.

### **Priapismus**

Hält die Erektion nach Einnahme von Sildenafil vier Stunden oder länger an (Priapismus), sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Falls der Priapismus nicht umgehend behandelt wird, kann dies zur Schädigung des Penisgewebes und zu dauerhaftem Potenzverlust führen.

### **Sehstörungen**

Bei der Einnahme von PDE-5-Inhibitoren kann es zu Sehstörungen und Fällen von nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie (NAION) kommen. Bei Auswirkungen auf das Sehvermögen sollte die Einnahme von PDE-5-Inhibitoren abgebrochen werden und ein Arzt aufgesucht werden.

### **Auswirkung auf die Blutung**

PDE-5-Inhibitoren selbst haben keine Wirkung auf die Aggregation von Thrombozyten, bei suprathérapeutischen Dosen können sie jedoch in vitro die aggregationshemmende Wirkung des Stickstoffmonoxid-Donators Natriumnitroprussid verstärken. Bei Menschen scheinen PDE-5-Inhibitoren allein oder in Kombination mit Acetylsalicylsäure keine Auswirkung auf die Blutungszeit zu haben.

### **Vermindertes Hörvermögen oder plötzlicher Verlust des Hörvermögens**

Patienten sollten darauf hingewiesen werden, im Falle einer plötzlichen Abnahme oder Verlust des Hörvermögens die Einnahme von PDE-5-Inhibitoren abzubrechen und umgehend einen Arzt aufzusuchen.

## **Was ist ferner zu beachten?**

Wie bei allen Arzneimitteln soll Tadacip ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Tadacip soll in der Originalverpackung, bei Raumtemperatur (15-25°C) und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Tadacip dürfen Sie nur auf Verschreibung eines Arztes bzw. einer Ärztin einnehmen. Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben. Geben Sie dieses Arzneimittel nie an andere Personen weiter, auch wenn sie die gleichen Symptome wie Sie haben.

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Die nicht verwendeten Tabletten sollen Sie Ihrer Apotheke zurückbringen.

Wenn Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin Ihnen sagt, dass Sie die Behandlung abbrechen sollen, sollten Sie alle nicht aufgebrauchten Tadacip Tabletten Ihrer Apotheke zurückbringen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

## **Was ist in Tadacip enthalten?**

Der Wirkstoff von Tadacip ist Tadalafil. Jede Tablette enthält 20 mg Tadalafil.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Cipla House, Peninsula Business Park,  
Ganpatrao Kadam Marg,  
Lower Parel, Mumbai-400013  
CIN: L24239MH1935PLC002380

Contact Numbers:

+91 22 24826000

+91 22 24826300

Fax Number:

+91 22 24826120

E-mail :

contactus@cipla.com